

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 1-9-81843863

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE  
ET FRANCHE-COMTÉ

ABONNEMENT ANNUEL : 70 F.

COTE-D'OR - SAONE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C.C.P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 29 - 31 Août 1981

## V I G N E

**OÏDIUM** : Dans certaines parcelles, en particulier de Chardonnay, l'oïdium a pris une extension exceptionnelle, compromettant parfois gravement la récolte. En situation tardive où la véraison est encore peu avancée, il est prudent de continuer la protection. Il sera parfois intéressant de faire précéder le traitement anti-oïdium d'une application de permanganate de potassium à la dose de 125 à 150 g/hl ; ajouter un mouillant et effectuer une pulvérisation copieuse (au moins 600 litres à l'hectare). Le traitement anti-oïdium (soufre en poudrage de préférence) doit suivre dans les meilleurs délais. Rappelons aussi qu'en présence de foyers deux applications à 8 jours d'intervalle sont conseillées avec Rubigan 4 ou Bayleton 5.

**POURRITURE GRISE** : Les prévisions de dates des vendanges, selon les vignobles, doivent être prises en considération pour effectuer le quatrième traitement spécifique anti-pourriture afin de respecter scrupuleusement les délais d'application avant récolte :

21 jours pour procymidone (Sumisclex)

15 jours pour vinchlozoline (Ronilan) et iprodione (Rovral)

Malgré les conditions météorologiques actuelles défavorables à l'implantation et à l'extension de cette maladie, ce dernier traitement peut être important pour une année dont la production s'annonce dans l'ensemble de faible à moyenne.

**ETOURNEAUX (SAONE-ET-LOIRE)** : Un groupe de travail comprenant l'I.N.R.A. (Station de la Faune Sauvage à JOUY-EN-JOSAS), l'A.C.T.A., le Service Viticole de la Chambre d'Agriculture de SAONE-ET-LOIRE et le Service de la Protection des Végétaux a décidé récemment d'essayer la méthode d'effarouchement acoustique préconisée par l'I.N.R.A. Des appareils seront mis en place prochainement dans le Val de Saône où les dégâts sont habituellement les plus sensibles. Les viticulteurs de cette région seront informés en temps utile, mais pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la Chambre d'Agriculture à MACON (Service Viticole) - Tél. (85) 38.50.66.

Par ailleurs une enquête est en cours afin de mieux connaître les zones intéressées et de détecter les dortoirs d'étourneaux. Toute personne qui pourrait donner des informations à ce sujet est priée de les adresser à :

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX (poste de MACON)

Cité administrative - MACON - Tél. (85) 38.63.63

## CULTURES LÉGUMIÈRES

**DESHERBAGE OIGNONS DE SEMIS** : Ne sont utilisables en pré-levée que les deux produits

suivants : - propachlore (Ramrod L)  
- chlorthal (Dacthal Procida)

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P196

